

**KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PEDIATRII**

**Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska**

Adres korespondencyjny:

Kliniczny Oddział Pediatryczny, Szpital Bielański; ul. Cegłowska 80; 01-809 Warszawa

oraz

Klinika Pediatrii; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa

tel. kom. konsultanta: +48 501 12 62 62

mail konsultanta: [tjackowska@cmkp.edu.pl](mailto:tjackowska@cmkp.edu.pl) oraz [tjackowska@gmail.com](mailto:tjackowska@gmail.com)

tel/fax sekretariatu: +48 22 864 11 67

mail sekretariatu: [klinikapediatrii@cmkp.edu.pl](mailto:klinikapediatrii@cmkp.edu.pl)

KK/PED/ 11 /06/2018

Warszawa, 11.06.2018

**Pan Minister**

**Marek Posobkiewicz**

Główny Inspektor Sanitarny

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

**Dotyczy: realizacji szczepień dzieci w 1 roku życia szczepionkami zakupionymi przez Ministra Zdrowia w ramach obowiązkowego PSO**

*szanowny Panie Ministrze*

W związku z Komunikatem prasowym Komisji Europejskiej opublikowanym w dniu 26 kwietnia 2018 r., w którym Komisja apeluje do krajów członkowskich m.in. o wprowadzeniu rutynowych kontroli statusu szczepień uprzejmie proszę o informację jak są i jak powinny być realizowane szczepienia w 1 roku życia u niemowląt, które otrzymują w czasie jednej wizyty cztery iniekcje przy użyciu szczepionek:

1. DTP,
2. Wzw typu B lub IPV,
3. Hib,
4. PCV 10.

Proszę o informację, w które miejsca ciała niemowlęcia mają być wykonane poszczególne szczepienia i czy prawidłowość podawania szczepionki zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego i przyjętymi w innych krajach zaleceniami (AAP, ACIP, Green Book) jest kontrolowana przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. W wielu krajach (np. UK) w zaleceniach organów decydujących o schemacie szczepienia i zakupionych szczepionkach jest ściśle określone w które miejsce ma być zrealizowane szczepienie, w które miejsce ma być podana określona szczepionka.

Czy szczepionkę DTP firmy Biomed można u niemowlęcia (dziecka w 1 roku życia) podawać w miesiąc naramienny. Towarzystwa naukowe i dostępne podręczniki zalecają, aby w pierwszym roku życia szczepienia realizować w przednioboczną część uda.

Stanowisko Pana Ministra jest niezwykle ważne dla pielęgniarek, lekarzy i rodziców.

Według mojej opinii w okresie zwiększającej się liczby osób odmawiających szczepień, a także przy założeniu, że dobro dziecka jest najważniejsze szczepienia u dzieci powinny być realizowane szczepionkami o jak najmniejszej reaktogenności, przy jak najmniejszej liczbie ukłuć, mających najlepsze pokrycie epidemiologiczne.

Ponadto uważam, że szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, adsorbowana (DTP) firmy Bio med ze względu na zawartość tiomersalu. (CHPL - 6.1 Wykaz substancji pomocniczych) powinna zostać natychmiast wycofana z PSO. Moje stanowisko podyktowane nie jest tym, że uważam że tiomersal zawarty w szczepionce wywołuje autyzm, ale tym że wzrasta liczba osób odmawiających szczepienia oraz liczba rodziców dzieci z autyzmem, wnoszących oskarżenia do sądu o odszkodowanie w związku z podaniem szczepionek zawierających tiomersal.

*Z pozdrowieniami*  
*T. Jackowska*

**Prof. nadzw. dr hab. med. Teresa Jackowska**

**Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii**

e-mail: [tjackowska@gmail.com](mailto:tjackowska@gmail.com); [tjackowska@cmkp.edu.pl](mailto:tjackowska@cmkp.edu.pl)

tel. kom.: (+48) 501126262

tel/fax sekretariatu: +48 22 864 11 67

**Do wiadomości**

1. **Łukasz Szumowski**, Minister Zdrowia
2. **Józefa Szczurek-Żelazko**, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
3. **Prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska**, Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych
4. **Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski**, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego