

**Hospitalizacje w oddziałach pediatrycznych w trybie pilnym w czasie pandemii SARS-CoV-2.
Badanie RT-PCR SARS-CoV-2 u dzieci i ich opiekunów.**

KOMUNIKAT 3.

Warszawa, 20.05.2020

Zalecamy wykonywanie testów RT-PCR SARS-CoV-2 u dzieci przyjmowanych w trybie pilnym oraz u opiekunów, którzy będą obecni przy dziecku w trakcie pobytu w oddziale pediatrycznym.

W czasie epidemii, pomimo niskiej (1-5%) zapadalności dzieci na COVID-19, należy podejrzewać u nich zakażenie SARS-CoV-2. Większość dzieci zakaża się SARS-CoV-2 po kontakcie rodzinnym, od swoich rodziców/opiekunów lub osób wspólnie zamieszkujących.

Zaleca się zbieranie wywiadu przed każdym przyjęciem dziecka do szpitala:

- a) czy dziecko w ostatnich 14 dniach miało kontakt z osobą z potwierdzonym COVID-19,
- b) czy dziecko w ostatnich 14 dniach miało kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji,
- c) czy dziecko ma aktualnie objawy wskazujące na COVID-19 (gorączka, kaszel, ból gardła, wymioty i biegunka, osłabienie, ewentualnie brak powonienia, smaku).

Dziecko (z jednym opiekunem) powinno być najpierw przyjęte do izolatki i tam oczekiwać na wynik badania SARS-CoV-2. Wszystkie procedury należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami medycznymi, zachowując zasady izolacji oddechowej. Personel medyczny zawsze powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Do czasu uzyskania wyniku badania dziecko oraz opiekun mogą opuszczać separatkę wyłącznie na zlecenie personelu medycznego.

W okresie pandemii COVID-19 inne choroby mogą zagrażać życiu i zdrowiu dziecka. Pandemia nie powinna uspić czujności pediatrów ani usprawiedliwiać opóźnienia przyjęcia dziecka do szpitala.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Ilarczyńska

Przewodnicząca zespołu doradczego ekspertów ds. dzieci podejrzanych lub zakażonych SARS-CoV-2

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych